

# ZENTIVA

## Acidità e Reflusso

### DOLORE E BRUCIORE DI STOMACO

Compresse masticabili

Gradevole gusto camomilla



Triplice azione contro acidità, dolore e bruciore di stomaco  
Con carbonato di calcio, idrossido di magnesio e simeticone

ZENTIVA ACIDITÀ E REFLUSSO è un dispositivo medico in forma di compresse masticabili, caratterizzato principalmente dall'associazione di 3 elementi: il carbonato di calcio, l'idrossido di magnesio e il simeticone.

Il prodotto, una volta giunto nel lume gastro-esofageo, neutralizza il pH dei succhi gastrici e dei vapori acidi, esplicando un'azione protettiva e lenitiva della mucosa gastro-esofagea. Ciò permette a ZENTIVA ACIDITÀ E REFLUSSO di agire rapidamente contro i dolori e i bruciori di stomaco dovuti ad iperacidità. La presenza di simeticone, una sostanza che ha la capacità di diminuire la tensione superficiale delle bolle di gas presenti nel tratto gastrointestinale facilitandone l'espulsione, riduce la sensazione di gonfiore e distensione addominale.

#### COMPOSIZIONE

Carbonato di calcio, idrossido di magnesio, simeticone, sorbitolo, sodio citrato, magnesio stearato, estratto aromatico di camomilla, idrossipropilcellulosa, maltodestrina, biossido di silicio, sucralosio.

#### DESTINAZIONE D'USO

ZENTIVA ACIDITÀ E REFLUSSO è indicato nel trattamento di bruciore e dolore allo stomaco causati dall'eccesso di acidità e nel trattamento dei sintomi associati al reflusso gastroesofageo. Il prodotto è utile anche in caso di difficoltà di digestione, bruciore e pesantezza (sintomi associati alla dispepsia).

#### POSOLOGIA E MODALITÀ D'USO

Adulti e bambini di età superiore ai 12 anni: Si consiglia l'assunzione di una compressa al bisogno (nel caso in cui si avvertano i sintomi di bruciore e/o dolore) da assumere dopo i pasti principali e la sera prima di coricarsi. Masticare bene prima di deglutire. Non superare la dose massima di 4 compresse al giorno.

#### AVVERTENZE

Prodotto non destinato all'uso nei bambini al di sotto dei 12 anni.

Non utilizzare in caso di ipersensibilità nei confronti di uno o più componenti.

In caso di reazioni indesiderate sospendere il trattamento e consultare il medico.

Il prodotto può interferire con l'assorbimento di medicinali ad uso orale. Si consiglia pertanto di consultare il medico in caso di assunzione contemporanea di medicinali ad uso orale, che devono in ogni caso essere somministrati ad una distanza di almeno 2 ore. Non utilizzare il prodotto per più di 2 settimane. In caso di ulteriore necessità consultare il medico.

Questo prodotto contiene una quantità di sodio pari a circa 28 mg, di calcio pari a circa 333 mg e di magnesio pari a circa 50 mg per singola dose di assunzione (pari a 1 cpr da 2,4 g).

Non utilizzare in caso di patologie o disfunzioni a carico dell'apparato renale. Consultare il medico in caso di ipercalcemia (elevati livelli di calcio nel sangue), ipermagnesemia (elevati livelli di magnesio nel sangue), nefrocalcolosi e calcoli renali ricidivi contenenti calcio.

In seguito all'assunzione del prodotto possono manifestarsi effetti collaterali lievi e transitori, quali: gonfiore, dolori addominali, eruttazione, flatulenza, costipazione. Il rispetto delle istruzioni per l'uso riduce il rischio di effetti collaterali indesiderati. Non ci sono controindicazioni all'uso in gravidanza e allattamento ma si consiglia in ogni caso di chiedere il parere del medico prima dell'utilizzo.

Non utilizzare se la confezione risulta aperta o danneggiata, o in presenza di alterazioni visibili dell'aspetto delle compresse.

Non usare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

#### CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.

Il prodotto deve essere conservato a una temperatura compresa fra gli 8°C e i 25°C, in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore.

La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezionamento integro e correttamente conservato. Non conservare parti di compressa per un utilizzo successivo.

Non gettare il prodotto nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chiedere al farmacista come eliminare i prodotti che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

#### FORMATO

ZENTIVA ACIDITÀ E REFLUSSO si presenta sotto forma di blister da 20 compresse masticabili da 2,4 g cad.



Biofarma S.p.A.  
Via Castelliere 2  
33036 Mereto di Tomba (UD)

Distributore:  
Zentiva Italia S.r.l.  
Viale Luigi Bodio, 37/B  
20158 Milano

 0373

DISPOSITIVO MEDICO

Data ultima revisione: luglio 2019

(IFU1\_07/19r0\_11/19)